

profender[®]
SPOT-ON
EMODEPSID, PRAZIKVANTEL



RUNDORM



BENDELORM



LUNGEORM

Behandling mot endoparasitter hos katt



www.vetpharma.no

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER



Katter som er ute kan risikere å bli smittet av både rundorm og bendelorm via smågnagere, andre byttedyr og omgivelsene.

Profender (emodepsid, prazikvantel) er effektivt mot alle relevante mage- og tarmparasitter hos katter i Norden, samt lungeorm (*Aelurostrongylus abstrusus*). Profender er også effektiv mot bendelorm (*Dipylidium caninum*), spolorm og alle larvestadiene, og overføringen av spolormlarver til kattunger gjennom morsmelken!

Anbefalt behandling

Katter (≥ 8 uker)

Rundorm (*nematoder*)

Kattens spolorm, *Toxocara cati*
(modne voksne, umodne voksne, L4 og L3)

1 dose

Toxascaris leonina
(modne voksne, umodne voksne og L4)

1 dose

Kattens hakeorm, *Ancylostoma tubaeforme*
(modne voksne, umodne voksne og L4)

1 dose

Kattens lungeorm, *Aelurostrongylus abstrusus* (Voksne)

2 doser med
2 ukers intervall.

Drektige katter

Spolorm, *Toxocara cati*
Forebygger overføring av
L3-larver via melken

1 dose, ca 1 uke
før fødsel

Bendelorm (*Cestoder*)

Vanlig bendelorm, *Taenia taeniaeformis* (Voksne)

1 dose

Loppebendelorm, *Dipylidium caninum* (Voksne)

1 dose

Revenes dvergbendelorm, *Echinococcus multilocularis* (Voksne)

1 dose



Profender finnes til 3 forskjellige vektclasser. Profender kan påføres av dyrehelsepersonell eller av dyreeieren selv. De aktive stoffene absorberes raskt gjennom huden.

En pakke inneholder to pipetter. En klinikkpakke inneholder førti pipetter.



Hold pipetten rett opp, vri og dra av hetten. Bruk motsatt side av hetten for å bryte forseglingen.



Skill pelsen på kattens nakke ved nedre del av hodet slik at huden blir synlig. Skal kun påføres hudoverflaten og på skadefri hud.



Sett pipettetuppen på huden og klem pipetten flere ganger for å tømme innholdet direkte på huden.

Doseringstabell

Kroppsvekt (kg)	Pipetestørrelse	Volum (ml)
≥ 0,5 - 2,5	Små katter	0,35 (1 pipette)
> 2,5 - 5	Middelstore katter	0,70 (1 pipette)
> 5 - 8	Store katter	1,12 (1 pipette)
> 8	Passende kombinasjon av pipetter	

Kattens navn: _____

År / Måned / Dag

Fødselsdato: _____

Kontaktopplysninger veterinær: _____



Gitt ormekur:



År / Måned / Dag

Katten behandlet med:

☐ Profender

☐ Annet

År / Måned / Dag

Katten behandlet med:

☐ Profender

☐ Annet

År / Måned / Dag

Katten behandlet med:

☐ Profender

☐ Annet

År / Måned / Dag

Katten behandlet med:

☐ Profender

☐ Annet

År / Måned / Dag

Katten behandlet med:

☐ Profender

☐ Annet

År / Måned / Dag

Katten behandlet med:

☐ Profender

☐ Annet

Profender 30 mg/7,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning til små katter, 60 mg/15 mg påflekkingsvæske, oppløsning til mellomstore katter, 96 mg/24 mg påflekkingsvæske, oppløsning til store katter (emodepsid og prazikvantel). **ATC-kode:** QP52A A51. **Indikasjon:** Til katter som har, eller er utsatt for, parasittære blandingsinfeksjoner forårsaket av følgende arter av rundorm (T.cati, T.leonina, A.tubaeforme), bendelorm (D.caninum, T.taeniaeformis, E.multilocularis) og lungeorm (A.abstrusus) hos katter. **Kontraindikasjoner:** Skal ikke brukes til kattunger under 8 uker eller som veier mindre enn 0,5 kg. **Bivirkninger:** Spyttskresjon og oppkast kan forekomme i svært sjeldne tilfeller. Lette og forbigående nevrologiske forstyrrelser slik som ataksi eller tremor kan oppstå i svært sjeldne tilfeller. Disse effektene er trolig et resultat av at katten slikker applikasjonsstedet rett etter behandlingen. I svært sjeldne tilfeller er det sett forbigående håravfall, kløe og/eller inflammasjon ved applikasjonsstedet. **Drektighet og diegiving:** Kan brukes under drektighet og diegiving. **Dosering:** Anbefalte minimumsdoser er 3 mg emodepsid/kg kroppsvekt og 12 mg prazikvantel/kg kroppsvekt, tilsvarende 0,14 ml Profender/kg kroppsvekt. Til behandling av lungeormen Aelurostrongylus abstrusus er én enkelt påføring, som gjentas etter 14 dager, tilstrekkelig. Til behandling av drektige katter, for å forebygge overføring av Toxocara cati (L3 larver) til avkommet via melken, er én enkelt påføring per behandling cirka 7 dager før forventet fødsel tilstrekkelig. Til behandling av lungeormen Aelurostrongylus abstrusus er én enkelt påføring, som gjentas etter 14 dager, tilstrekkelig. **Administrering:** Kun til utvortes bruk. Ta en pipette ut av pakningen. Hold pipetten rett opp, vri og dra av hetten og bruk motsatt side av hetten for å bryte forseglingen. Skill pelsen på kattens nakke ved nedre del av hodet slik at huden blir synlig. Sett pipettetuppen på huden og press hardt flere ganger for å tømme innholdet direkte på huden. Påføring på nedre del av hodet vil begrense kattens mulighet til å slikke av preparatet. **Oppbevaring og holdbarhet:** Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. **Pakninger:** 0,35 ml, 0,70 ml og 1,12 ml per pipette. Blisterpakninger inneholdende 2, 4, 12, 20 eller 40 endosepipetter. Kun for 0,70 ml pipette: også blisterpakning inneholdende 80 pipetter. **Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:** 25.01.2021. **Fullt SPC kan leses på** www.felleskatalogen.no.

Innehaver av markedsføringstillatelse: Vetoquinol S.A., Magny-Vernois
70200 Lure, Frankrike. **Distributør:** VetPharma AS, Ravnsborgveien 31, 1395
Hvalstad. +47 400 00 541.

www.vetpharma.no



VP 03/2024NO